

NAVELA® 1,5 mg Tabletten

Wirkstoff: Levonorgestrel

NEU
ab 1.11.2016

Keine
Kontraindikation
für die Weiterführung der
regelmäßigen hormonellen
Kontrazeption



PZN 12457147 (AVP 17,98 €)

Notfall-Kontrazeptivum zur Verhinderung einer Schwangerschaft

- Bei Versagen einer Verhütungsmethode, wie z. B. Vergessen der regelmäßigen Einnahme oraler Kontrazeptiva
- Nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr
- Zur Einnahme innerhalb von 72 Stunden



Abgekürzte Information für Navela® 1,5 mg Tabletten - bitte konsultieren Sie d. vollständige Fachinformation. Apothekenpflichtig. Wirkstoff: Levonorgestrel. **Zus.:** 1 Tablette enth.: Levonorgestrel 1,5 mg. Sonstige Bestandt.: Lactose-Monohydrat, Mikrokristalline Cellulose, Poloxamer 188, Croscarmellose-Natrium, Magnesiumstearat [pflanzlich]. **Anwend.:** Navela® ist ein Verhütungsmittel für den Notfall, das **innerhalb von 72 Stunden (3 Tage)** nach einem ungeschützten Geschlechtsverkehr oder bei Versagen der gewohnten Verhütungsmethode eingenommen werden kann. **Gegenanz.:** Überempfindl. gg. d. Wirkstoff od. einen d. sonst. Bestand. **Warnh.:** Bei Frauen die in den letzten 4 Wochen bestimmte andere Arzneimittel, insbesondere zur Behandlung der Epilepsie, Tuberkulose, einer HIV-Infektion oder pflanzliche Arzneimittel, die Johanniskraut enthalten, eingenommen haben (siehe Packungsbeilage), könnte Navela weniger wirksam sein. Absprache mit dem Arzt oder Apotheker ist notwendig bevor Navela eingenommen wird. **Nebenw.:** Sehr häufig: Kopfschm., Übelkeit, Schmerzen im unteren Abdomen, unabh. von d. Menstruation auftretende Blutungen, Müdigkeit. Häufig: Schwindel, Durchfall, Erbrechen, Regelblutung mehr als 7 Tage verspätet, Zwischen- und Schmierblutungen, Spannungsgefühl der Brust. Sehr selten: Bauchschm., Ausschlag, Urtikaria, Pruritus, Beckenschm., Dysmenorrhoe, Gesichtssödem. **Zul.-inh.:** Exeltis Germany GmbH, Adalperostraße 84, 85737 Ismaning, Tel.: +49 89 4520529-0. **Stand:** September 2016

Informationen zur Beratung und Verordnung einer Notfallkontrazeption mit Levonorgestrel

Indikationen für eine Notfallkontrazeption:

Geschlechtsverkehr ohne Verhütungsmittel, Versagen oder falsche Anwendung einer Verhütungsmethode.

Zeitpunkt der Einnahme:

Nehmen Sie die **NAVELA® 1,5 mg Tablette** so bald wie möglich, vorzugsweise innerhalb von 12 Stunden und nicht später als 72 Stunden (3 Tage) nach dem ungeschützten Geschlechtsverkehr, ein.

Ausschluss einer Schwangerschaft (Zyklusanamnese):

NAVELA® 1,5 mg Tabletten verschiebt die Ovulation und ist daher nur wirksam, wenn sie rechtzeitig vor der Ovulation eingenommen wird. In der Regel findet die Ovulation etwa 14 Tage vor Einsetzen der nächsten Menstruation statt, unterliegt aber individuellen Schwankungen und ist nicht exakt vorhersagbar.

Dosierung bei Interaktion mit anderen Medikamenten:

Wurden innerhalb der letzten 4 Wochen enzyminduzierende Arzneimittel [Leberenzyminduktoren, hauptsächlich durch CYP3A4-Enzyminduktoren, wie z. B. Johanniskraut (*Hypericum perforatum*), Barbiturate (einschließlich Primidon), Phenytoin, Carbamazepin, Ritonavir, Rifampicin, Rifabutin, Grisefulvin] eingenommen, ist die Einnahme einer doppelten Dosis Levonorgestrel - 3 mg - zu empfehlen.

Erstattungsfähigkeit:

NAVELA® 1,5 mg Tabletten ist rezeptfrei und für Frauen bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres erstattungsfähig.